

# (七) 中醫五官科

## I. 眼 科

### 白睛疾病

- 1、診 斷：暴風客熱  
主 症：1) 發病突然，患眼胞臉紅腫，白睛紅赤，疼痛，甚或紅腫疼痛較重，白睛浮腫。  
2) 羞明多淚，或眵淚膠粘。  
3) 惡寒發熱，頭痛鼻塞，或有口渴，溲赤便秘，脈數。

病假建議：1-3 天

- 2、診 斷：天行赤眼 (紅眼病)、天行赤眼暴翳  
主 症：1) 有天行赤眼流行與接觸史。  
2) 發病迅速，雙眼發病或雙眼先後發病。  
3) 患眼紅赤，或見白睛有點、片狀溢血。  
4) 眼目澀癢交作，怕熱羞明，眵多膠粘。  
5) 並發天行赤眼暴翳，則見白睛混赤浮腫，黑睛簇生星翳，視物不清，疼痛、畏光、流淚，或胞臉紅腫疼痛。發熱、頭痛。

病假建議：1-5 天

- 3、診 斷：金疳  
主 症：1) 患眼澀痛畏光，或有微痛，流淚眵多。  
2) 白睛表面出現灰白色的小顆粒，形如玉粒，周圍有赤脈纏繞。

病假建議：1-2 天

- 4、診 斷：火疳  
主 症：1) 患眼澀痛，羞明流淚，視物不清，逐漸加重。

- 2) 白睛深部向外突起一紫紅結節，形圓或橢圓，大小不等，推之不移，壓痛明顯；結節逐漸增大，周圍布有紫紅血脈。一般不潰破。
- 3) 失治可危及黑睛、瞳神。

病假建議：1-3 天

## 黑睛疾病

1、診 斷：聚星障

- 主 症：
- 1) 發病急，初期眼內沙澀疼痛，畏光流淚，抱輪或有紅赤。
  - 2) 黑睛驟生細小星翳，多少不一，色灰白或微黃，狀如雲霧，或樹枝，一般不化膿，病程較長。
  - 3) 嚴重者，可並發花翳白陷、凝脂翳等。
  - 4) 全身可有發熱、頭痛、脈數等。

病假建議：1-5 天

2、診 斷：花翳白陷

- 主 症：
- 1) 患眼刺痛，或頭目劇痛，胞瞼紅腫，羞明流淚，抱輪紅赤，或白睛混赤。
  - 2) 黑睛四周驟起翳障，色灰白或微黃，漸漸厚闊，中間低陷，甚則深陷，狀如花瓣、碎米，或如魚鱗。
  - 3) 全身可有發熱、頭痛、脈數等。
  - 4) 嚴重者可並發瞳神緊小、黃液上沖等。

病假建議：1-5 天

3、診 斷：凝脂翳

- 主 症：
- 1) 初期，眼內沙澀，灼熱刺痛，畏光流淚，眵多粘稠，視力障礙，白睛紅赤，黑睛生翳如星，色灰白或微黃，表面污濁，邊緣不清，中央凹陷，狀如針刺傷痕，其上如覆薄脂。
  - 2) 病情發展，頭目劇痛，胞瞼腫脹，羞明難睜，熱淚如湯，白睛混赤壅腫，黑睛如覆一片凝脂，色黃肥嫩，邊緣不清，凹陷漸大漸深，甚或延及整個黑睛，並有黃液上沖。
  - 3) 病情繼續發展，可穿破黑睛而成蟹睛。
  - 4) 若凝脂為黃綠色者，病勢更為凶險，黑睛可於二三日內全部毀壞、

潰破、黃仁突出，甚或膿攻全珠，眼球塌陷而失明。

病假建議：1-5 天

- 4、診 斷：風輪赤豆  
主 症：1) 急性發作，患眼紅赤疼痛，羞明流淚。  
2) 赤豆自氣輪成束狀向風輪發展，狀如彗星，色紅腫厚。

病假建議：1-2 天

- 5、診 斷：赤膜下垂、血翳包睛  
主 症：1) 患眼羞明流淚，癢痛兼作，視力下降或嚴重障礙。  
2) 黑睛上緣出現灰白色翳膜，有赤脈密集牽絆，下垂至黑睛；或赤膜厚大，漫入黑睛，形成血翳。

病假建議：1-5 天

- 6、診 斷：宿翳  
主 症：1) 視物昏矇，眼內乾澀不適。  
2) 黑睛上有白色翳障，形狀不一，厚薄不等，表面光滑，邊緣清晰。

病假建議：1-5 天

## 瞳神疾病

- 1、診 斷：瞳神緊小  
主 症：1) 發病急，羞明流淚，眼珠墜痛拒按，眉楞骨痛，或通連額顳，視物模糊，或自覺眼前似有蚊蠅飛舞等。  
2) 抱輪紅赤，黃仁色暗，紋理模糊，瞳神縮小，展縮失靈。或瞳神偏缺不圓。  
3) 嚴重者，可並發黃液上沖。

病假建議：1-7 天

- 2、診 斷：綠風內障  
主 症：1) 發病急驟，眼珠脹痛欲脫，頭痛如劈，痛連目眶、鼻、頰、額、顳等。  
2) 視力急降，甚或降至僅存光感或失明。  
3) 胞臉微腫，抱輪深紅，甚或白睛混赤。  
4) 黑睛霧狀混濁，瞳神散大，展縮失靈，瞳內氣色略呈淡綠。  
5) 指捫眼珠變硬，甚或脹硬如石。  
6) 常伴有噁心、嘔吐，煩躁易怒，或惡寒發熱等。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

- 3、診 斷：暴盲  
主 症：1) 發病前眼無不適，突然視力急劇下降，甚至失明。  
2) 或有前額隱痛，眼珠壓痛和轉動眼珠時牽引樣痛。

病假建議：1-7 天 (可參考其他檢查結果)

- 4、診 斷：瞳神乾缺  
主 症：1) 視力下降，眼目乾澀不適，赤痛時輕時重，反復發作。  
2) 瞳神失去正圓，邊緣參差不齊，黃仁乾枯不榮。

病假建議：1-7 天

- 5、診 斷：青風內障  
主 症：1) 常有頭暈頭痛，眼珠脹痛，視物昏花。  
2) 視野日漸縮小，瞳神輕度散大，瞳色淡綠，眼珠稍硬。

病假建議：1-3 天 (可參考其他檢查結果)

- 6、診 斷：雲霧移睛  
主 症：自覺眼前黑影茫茫，如蛛絲飄浮，或如蚊蠅飛舞，隨睛而動，視力減退。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

- 7、診 斷：視瞻昏渺  
主 症：視物昏矇，如有輕紗薄霧遮隔，或眼前黑花飛舞，或有閃光幻覺，或見眼前中央有一團灰色或黃褐色陰影，視物變形。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

- 8、診 斷：高風內障  
主 症：1) 夜視或黑暗處視物不清，行動困難，至天明或光亮處視力正常。  
2) 視野逐漸縮小，甚或縮窄如管狀，僅見眼前事物，行動極為困難，終至失明。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 胞瞼疾病

- 1、診 斷：針眼  
主 症：1) 發病較急，胞瞼癢痛不適。  
2) 近瞼弦局限性紅腫，壓痛，數日後成膿，形如麥粒。  
3) 病發於眥部者，則局限性紅腫，疼痛較劇，白睛赤腫，或耳前、頰下有腫核壓痛等。  
4) 全身或有發熱惡寒，頭痛等。

病假建議：1-3 天

- 2、診 斷：椒瘡  
主 症：1) 眼睛癢澀不適，羞明、流淚。  
2) 瞼內有細小紅赤顆粒，質硬，量多。  
3) 或有白睛紅赤。

病假建議：1-3 天

- 3、診 斷：粟瘡  
主 症：1) 急性發作，眼睛癢澀疼痛，羞明流淚。  
2) 下瞼內有粟粒樣黃白色半透明顆粒，大小均勻，境界清除。  
3) 或有眼瞼水腫，白睛紅赤，多眵等。

病假建議：1-2 天

- 4、診 斷：風赤瘡痍  
主 症：1) 胞瞼皮膚灼熱發癢，紅腫或焮痛，起水泡，滲水，或成膿泡、糜爛、結痂。  
2) 全身或有濕疹、及熱毒性疾患。

病假建議：1-2 天

- 5、診 斷：胞腫如桃  
主 症：1) 起病急，胞瞼焮熱紅赤，腫脹明顯，疼痛，眼瞼閉合不開。甚或成癰化膿。  
2) 全身多由惡寒發熱，頭痛，全身不適等。

病假建議：1-3 天

- 6、診 斷：胞腫如球  
主 症：雙眼瞼腫脹較甚，虛軟如球，皮色正常，甚或目閉難開。

病假建議：1-2 天

- 7、診 斷：風牽偏視  
主 症：1) 發病急，單眼或雙眼上胞下垂，眼珠偏視，轉動受限，視一為二。  
2) 或有口眼歪斜。  
3) 可伴有頭暈、噁心、嘔吐，步態不穩等。

病假建議：1-4 天

## 其他眼病

- 1、診 斷：漏睛瘡  
主 症：1) 發病較急，大眦部睛明穴下方皮膚紅腫高起，逐漸增大，焮痛拒按。成膿後則潰破流膿。膿出腫消。  
2) 病甚者可腫及面頰與鼻部，眼瞼紅腫。  
3) 可有發熱、頭痛等全身症狀。

病假建議：1-3 天

- 2、診 斷：眼外傷  
主 症：1) 有眼外傷、酸鹼化學物質入目、光照射病史。  
2) 眼目腫痛，視力下降。  
3) 眼目有不同程度的損傷，如眼瞼受傷、白睛受傷、瞳神受傷、晶珠受傷、眼底受傷、眼眶受傷，甚或真睛破損等。

病假建議：1-3 天

- 3、診 斷：突起睛高  
主 症：1) 發病急，眼部疼痛，甚或跳痛難忍，淚熱如湯，視力下降或驟降。  
2) 眼部、胞瞼、白睛紅腫，眼珠或眶內化膿，睛高突起，甚或高突出眶，轉動失靈，或膿汁穿眼而出。  
3) 發熱頭痛，甚或噁心嘔吐，高熱昏迷等。

病假建議：1-7 天

## II. 耳 科

- 1、診 斷：耳癬、耳瘡  
主 症：1) 耳部灼熱疼痛，咀嚼時耳痛明顯。  
2) 外耳道內有局限性紅腫，或彌漫性紅腫、潰爛、滲液等。  
3) 可有惡寒發熱、頭痛等全身症狀。

病假建議：1-2 天

- 2、診 斷：耳脹  
主 症：1) 發病急，自覺耳內悶脹堵塞感，微痛，聽力減退，或有耳鳴。  
2) 耳膜微紅，輕度內陷，或有變位性液平。  
3) 全身或有發熱惡寒、頭痛、鼻塞、流涕、咽痛，脈數等。

病假建議：1-3 天

- 3、診 斷：急膿耳  
主 症：1) 發病急，耳內悶脹，疼痛，甚或跳痛連頭，聽力減退。繼則耳內流膿，膿出耳痛減輕。  
2) 耳膜紅腫、穿孔。  
3) 全身有發熱惡寒，頭痛，鼻塞，周身不適等。

病假建議：1-3 天

- 4、診 斷：膿耳變證  
主 症：1) 有急性或慢性膿耳病史。  
2) 並發耳根毒者，耳後完骨部紅腫疼痛，發熱，頭痛等。  
3) 並發膿耳面癱者，卒發單側顏面麻痺，口眼歪斜等。  
4) 並發黃耳傷寒者，卒發寒戰發熱，頭痛劇烈，耳內流膿腐臭，甚或高熱，神昏譫語等。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

- 5、診 斷：耳損傷  
主 症：1) 有耳部受傷病史。  
2) 有不同程度的外耳、中耳(耳膜)、內耳或顛部損傷、出血、瘀腫疼痛，聽力減退或全聾、眩暈等。

病假建議：1-5 天

- 6、診 斷：耳鳴、耳聾  
主 症：1) 單耳或雙耳鳴響不止，煩躁不安等。  
2) 單耳或雙耳聽力減退或喪失。

病假建議：1-3 天 (可參考其他檢查結果)

- 7、診 斷：暴聾  
主 症：1) 發病突然，單耳或雙耳聽力嚴重減退，甚或全聾。  
2) 或有耳鳴、眩暈、耳周麻木感等。  
3) 發病原因不明。  
4) 耳膜無明顯病變。

病假建議：1-7 天 (可參考其他檢查結果)



8、診 斷：耳眩暈

- 主 症：1) 眩暈突然發作，自覺天旋地轉，身體傾倒感，站立不穩。  
2) 多有耳鳴、聽力減退，耳內脹滿感，噁心嘔吐，或面色蒼白，出冷汗等。  
3) 有眩暈反復發作病史。

病假建議：1-3 天 (可參考其他檢查結果)

### III. 鼻 科

1、診 斷：急鼻淵

- 主 症：1) 發病急，鼻塞、流涕如膿，量多，頭痛明顯。  
2) 鼻腔粘膜淡紅或色紅腫脹，鼻道積有大量膿涕。  
3) 全身有發熱、惡寒，周身不適等。

病假建議：1-3 天 (可參考其他檢查結果)

2、診 斷：鼻衄

- 主 症：1) 鼻腔出血，量多，不易自止。  
2) 鼻腔粘膜或鼻中隔糜爛，有出血點。  
3) 可有頭暈頭痛，急躁易怒，舌紅脈數等。

病假建議：1-2 天

3、診 斷：鼻疔

- 主 症：1) 外鼻部灼熱癢痛，或疼痛劇烈。  
2) 外鼻部有局限性紅腫，數日後成膿，潰破膿出而愈。  
3) 嚴重者，可並發鼻疔走黃。

病假建議：1-2 天

- 4、診 斷：鼻疳、鼻瘡  
主 症：1) 外鼻部灼熱癢痛不適。  
2) 鼻部彌漫性紅腫、潰爛、滲液或流膿，結痂等。  
3) 有發熱頭痛等。

病假建議：1-2 天

- 5、診 斷：鼻損傷  
主 症：1) 有鼻部損傷的病史。  
2) 程度的鼻損傷症狀，如疼痛、瘀腫、出血、甚或鼻骨骨折等。

病假建議：1-3 天

## IV. 咽喉科

- 1、診 斷：急乳蛾 (風熱乳蛾)  
主 症：1) 發病急，咽部乾燥灼熱疼痛，逐漸加重，吞嚥時尤甚，甚或吞嚥困難。  
2) 喉關色紅，喉核紅腫，表面或有黃白膿點。  
3) 發熱惡寒，或高熱，頭痛，鼻塞，周身不適，咳嗽等。

病假建議：1-3 天

- 2、診 斷：急咽痹 (風熱喉痹)  
主 症：1) 發病急，咽部灼熱疼痛，乾燥不適，吞嚥時痛甚。  
2) 咽腔紅腫，咽底有紅色顆粒突起，表面或有黃白分泌物。  
3) 發熱惡寒，或高熱，頭痛，咳嗽，咳痰黃稠等。

病假建議：1-3 天

- 3、診 斷：喉癰  
主 症：1) 咽喉疼痛劇烈，吞嚥時痛甚，或吞嚥困難，湯水難入，痰涎壅盛。  
2) 咽腔紅腫，喉關一側，或咽底一側紅腫高突，或下頷部腫脹，壓痛明顯。  
3) 患側下頷角有瘰核，壓痛。  
4) 高熱寒戰，全身不適，口乾口苦，大便秘結，舌紅苔黃，脈數。

**病假建議：** 1-5 天

4、診 斷：急喉暗

主 症：1) 發病急，聲音嘶啞，喉部乾痛灼熱，發聲時喉痛加重。  
2) 喉部紅腫，聲帶色紅腫脹。  
3) 發熱，咳嗽，咳痰，周身不適等。

**病假建議：** 1-3 天

5、診 斷：慢喉暗

主 症：1) 聲音不揚或嘶啞，時輕時重，經久不愈。講話多則嘶啞明顯。  
2) 喉部灼熱、發癢、乾燥、異物感等。

**病假建議：** 1-2 天 (可參考其他檢查結果)

6、診 斷：牙痛、牙癰、牙齦癰

主 症：1) 牙痛較甚，影響工作。  
2) 牙齦紅腫或化膿，或有深度齲齒、或牙齦處紅腫，張口困難等。

**病假建議：** 1-2 天