

(六) 中醫外科

瘡 瘍

1、診 斷：癰

主 症：局部皮膚紅腫、熱痛為主，突起根淺，腫勢限局，範圍多在 3cm 左右，易膿、易潰、易斂，可有單個或多個出現。

病假建議：1-2 天 (若有發熱等全身症狀者)

2、診 斷：疔瘡

主 症：多發生在顏面、手足等處的急性化膿性疾病，初起為一粟粒樣膿頭，以後逐漸紅腫熱痛，根深堅硬，狀如釘丁，可有惡寒、發熱等全身症狀。

病假建議：1-3 天

3、診 斷：紅絲疔

主 症：因四肢遠端化膿性病灶向上蔓延，呈紅絲狀在大腿內側向上走竄。在肘、腋、臍窩、腹股溝部伴有瘰核腫痛，兼有惡寒發熱等全身症狀。

病假建議：1-3 天

4、診 斷：疫疔

主 症：接觸疫畜或其皮毛 1-3 天後，在頭面、頸項、手臂等暴露部位，出現一小紅色斑丘疹，狀如蟲叮水疱，很快乾枯壞死如臍凹，伴有發熱、頭痛、骨楚等全身症狀，相當於西醫的「炭疽」。

病假建議：本病屬急性傳染病，應轉送醫院進一步診治，病假由醫院決定。

5、診 斷：爛疔

主 症：發生在皮肉間，容易腐爛，病勢暴急的急性感染性疾病。發病前多有手足外傷及接觸泥土、污物史，起病急驟，患肢焮熱腫脹疼痛，有沉重和包紮過緊感，繼則出現「脹裂樣」疼痛，瘡口周圍皮膚高度水腫，緊張光亮，瘡形略帶凹狀(如匙面)，並有許多大小水疱，皮肉迅速腐爛，流出臭穢味膿液，易併發走黃，可危及生命，相當

於西醫的「氣性壞疽」。

病假建議： 迅速送醫院治療，病假應由醫院根據病情決定。

6、診 斷：癰

主 症：在皮肉之間的急性化膿性炎證，以表淺膿腫與核化膿為主。是好發於頸部兩側、腋窩、腹股溝、臍窩和臍部的化膿性疾病，常影響關節活動。頸癰、腋癰、胯腹癰、委中毒、臍癰為常見的「癰」病。

病假建議： 1-3 天

7、診 斷：發

主 症：「癰之大者」名「發」，在皮肉間病變範圍較癰為大的化膿性炎證，表面紅腫痛熱，四周邊緣不清，常伴有發熱等全身症狀。

病假建議： 1-3 天

8、診 斷：有頭疽

主 症：好發於項後、背部的急性化膿性疾病。先有粟粒樣膿頭，焮熱紅腫脹痛。膿頭相繼增多，潰爛之後，狀如蓮蓬蜂窩，相當於西醫的「癰」。

病假建議： 1-3 天

9、診 斷：無頭疽

主 症：發生在骨、關節的急性或慢性化膿性疾病，可影響關節伸屈。在急性發作期，有高熱寒戰等全身症狀。「附骨疽」為骨髓的化膿性疾病，「環跳疽」是髖關節的化膿性疾病。

病假建議： 1-7 天 (急性發作期)

10、診 斷：丹毒

主 症：初起即有惡寒發熱，頭痛骨楚等全身症狀。繼之局部皮膚出現小片紅斑，迅速蔓延成一大片稍高出皮面的、色如塗丹的鮮紅斑。該紅斑壓之退色，摸之灼手，觸痛明顯。

病假建議： 1-3 天

11、診 斷：發頤

主 症：「頤」即指面頰與腮腺，在頤頷間出現腫脹疼痛，張口受限，腮腺口有粘稠分泌液或膿液溢出，屬急性化膿性腮腺炎。

病假建議： 1-3 天

12、診 斷：流注

主 症：肌肉深部的多發性膿腫，可伴寒戰高熱、周身關節疼痛及頭痛等全身症狀。相當於西醫的膿血證、肌肉深部膿腫、髖窩膿腫。

病假建議： 1-3 天

必要時應轉醫院治療，病假應由醫院決定。

13、診 斷：疔瘡走黃

主 症：疔瘡之原發病灶忽見瘡頂陷黑無膿，腫勢軟漫，迅速向四周擴散，皮色暗紅不鮮。伴有高熱寒戰，頭痛，煩躁不安，惡心嘔吐等全身症狀。

病假建議： 本病因疔瘡火毒熾盛，走散入血，內攻臟腑，引致的危急疾病，相當於西醫學的毒血證、敗血證、膿血證，應立即轉醫院診治。

乳房疾病

1、診 斷：乳癰

主 症：乳房局部有紅腫痛熱的腫塊，可有波動感，是乳房的急性化膿性疾病。

病假建議： 1-3 天

- 2、診 斷：乳發
主 症：在乳房肌膚之間的嚴重化膿性炎證，局部紅腫，疼痛劇烈，迅速蔓延，繼之皮肉腐爛壞死。

病假建議：1-3 天

- 3、診 斷：乳漏
主 症：乳房或乳暈部有久不收口之漏管，流出濃水、乳汁及豆渣樣物。

病假建議：若應用藥線拔管或掛線療法，術後休息 1-7 天。

瘰 癧

- 診 斷：瘰癧
主 症：頸前的甲狀腺灼熱腫痛，兼有高熱寒戰等全身症狀。也可出現氣促、聲嘶、吞咽困難等壓迫症狀，相當於西醫的急性甲狀腺炎。

病假建議：1-3 天

血 瘤

- 診 斷：血瘤
主 症：淺表毛細血管增生、擴張、迂曲，叢集而成的海綿狀血管團。

病假建議：若進行外治腐蝕或硬化療法，休息 1-4 天。

皮膚病

- 1、診 斷：熱瘡
主 症：發熱後或高熱過程中在皮膚粘膜交界處，尤以口角、唇緣、鼻孔周圍、面頰及外陰等部位出現成群的水疱，有的互相融合，是急性疱疹性皮膚病。

- 2、診 斷：蛇串瘡
主 症：皮膚上出現呈帶狀分佈的成簇水疱，常纏腰而發，痛如火燎，是急性疱疹性皮膚病。
- 3、診 斷：黃水瘡
主 症：發於皮膚淺表的膿疱瘡，常好發於頭面、四肢等暴露部位，可蔓延全身，自覺瘙癢，有發熱、口渴等全身症狀，是一種有傳染性的化膿性皮膚病。
- 4、診 斷：蟲咬皮炎
主 症：被蟲類叮咬或接觸其毒液、毒毛，引起皮膚呈丘疹樣風團、瘀點、水疱、紅斑等。自覺奇癢、灼熱或疼痛。可引起畏寒發熱，惡心胸悶，甚至呼吸困難等全身症狀。
- 5、診 斷：濕瘡
主 症：發生在體表的過敏性炎證，皮損為多數密集的大小丘疹、丘疱疹，劇烈瘙癢。
- 6、診 斷：藥毒
主 症：藥物引起的皮膚過敏性病變，自覺灼熱、瘙癢難忍，皮損形態多樣，可有蕁麻疹樣、麻疹樣、多形紅斑樣、固定紅斑樣、濕疹皮炎樣、剝脫性皮炎樣、大疱性表皮鬆解樣等特徵。
- 7、診 斷：癩疹
主 症：皮膚上出現紅色或蒼白色風團，發無定處，時忍時現，驟起驟退，消退後不留痕跡，劇烈痕癢，是一種過敏性皮膚病。
- 8、診 斷：皮膚瘙癢證 (風熱血燥型)
主 症：皮膚瘙癢劇烈，遇熱更甚，心煩口乾，大便燥結，舌質紅、苔薄黃，脈浮數。
- 9、診 斷：皮膚瘙癢證 (濕熱蘊結型)
主 症：皮膚瘙癢難忍，抓破後脂水淋漓，胸脅脹滿，口乾苦，舌質紅、苔黃膩，脈滑數。

- 10、診 斷：風熱瘡
主 症：皮膚出現斑疹，色紅如玫瑰，脫屑如糠秕。可伴有頭痛發熱，頸與腋下結腫痛等證，是一種急性皮膚病。
- 11、診 斷：貓眼瘡
主 症：以紅斑為主，兼有丘疹、水疱等多形性皮損。發病急驟，常累及口腔、二陰粘膜，甚至可引起內臟損害，是一種急性炎症性皮膚病。
- 12、診 斷：白瘡 (關節炎型)
主 症：皮損狀如鬆皮，形如疹疥，是一種搔起白皮的紅斑鱗屑性皮膚病。本型常累及大小關節，有紅腫熱痛，也可導致骨質破壞，伴有全身發熱等全身症狀。
- 13、診 斷：白瘡 (紅皮病型)
主 症：皮損呈彌漫性潮紅、紫紅，甚至腫脹浸潤，大量脫屑，僅有少數片狀皮膚正常，猶如島嶼狀。
- 14、診 斷：白瘡 (膿疱型)
主 症：皮損局限於刺激部位，以掌跖部位居多。皮損為紅斑上有大小不等的膿疱，重者泛發全身，常伴有發熱、關節疼痛等。
- 15、診 斷：紅蝴蝶瘡 (系統性)
主 症：皮損好發於面頰部，狀如紅蝴蝶，並有全身多系統、多臟器損害。常合併發熱、關節痛及腎、心血管、肺、消化道損害等症狀，後期可有神經系統症狀。

病假建議：1-3 天

肛門直腸疾病

- 1、診 斷：內痔
主 症：生於肛門齒線以上，直腸末端粘膜下的曲張痔靜脈團。常有便後滴血及痔核脫出。若脫出難以回納者，可形成嵌頓，產生腫脹、劇痛，甚至糜爛、壞死。

病假建議： (1)發生嵌頓者，手法回納後休息 1-2 天。
(2)應用枯痔釘、硬化、結扎法者，術後休息 1-7 天。

2、診 斷：血栓性外痔
主 症：肛門突然劇烈疼痛，外痔核呈紫暗色的血凝腫塊。

病假建議： 1-4 天

3、診 斷：混合痔
主 症：發生於肛門齒線之間的曲張靜脈團，可見內外痔相連，無明顯分界，一並隆起。內痔部份可脫出，甚至嵌頓。

病假建議： (1)若發生脫出嵌頓者，手法回納後休息 1-2 天。
(2)若用外治術治療，術後休息 1-7 天。

4、診 斷：肛裂 (血熱瘀滯型)
主 症：肛管的皮膚全層裂開，肛門緊縮，裂口呈紫暗色，劇痛難忍。大便燥結，便時與便後均有滴血。舌質紫黯，脈弦數。

病假建議： 1-3 天

5、診 斷：肛癰 (熱毒熾盛型)
主 症：肛門腫痛劇烈，痛如雞啄，肛周紅腫有膿液，按之波動感，常伴有發熱惡寒等全身症狀。舌紅苔黃，脈弦滑數。

病假建議： 1-3 天

6、診 斷：肛癰 (火毒蘊結型)
主 症：肛門周圍突然腫痛，並持續加劇。肛周灼熱紅腫，伴有發熱惡寒，便秘溲赤。舌紅苔黃，脈數。

病假建議： 1-3 天

7、診 斷：肛漏
主 症：直腸、肛管與周圍皮膚形成相通的瘻管，過去常有肛門、直腸周圍膿腫反覆發作史。

病假建議： 若進行掛線療法，休息 1-7 天。

- 8、診 斷：脫肛
主 症：直腸粘膜、肛管、直腸和部份乙狀結腸向下移位，並脫出肛門外。
病假建議：(1)免粗重工作。
(2)若進行肛周硬化療法，可建議病假 1-3 天。
- 9、診 斷：息肉痔
主 症：在直腸、結腸粘膜上有贅生物，大便常帶血或便後滴血。若贅生物為位置較高的小息肉，一般無症狀；若為低位帶蒂息肉，大便可脫出肛門外；若為多發性息肉，常伴有腹痛、腹瀉及帶血性粘液便。
病假建議：若進行硬化療法，可建議病假 1-3 天。

泌尿、男性前陰病

- 1、診 斷：急性子癰 (濕熱下注型)
主 症：突然發作的睪丸或附睪腫大疼痛，甚者痛如刀割。陰囊皮膚紅腫，灼熱疼痛，膿腫形成時，按之應手。並有少腹抽痛，惡寒發熱等。苔黃膩，脈滑數。

病假建議：1-3 天
- 2、診 斷：囊癰
主 症：陰囊紅腫灼痛，甚則積膿，常伴有發熱寒戰等全身症狀。

病假建議：1-3 天
- 3、診 斷：精濁 (濕熱蘊結型)
主 症：尿道呈灼熱感，可有白濁流出，併有尿頻、尿急、尿痛和會陰、腰下、睪丸墜脹疼痛，苔黃膩，脈滑數。

病假建議：1-3 天

脫 疽

診 斷：脫疽

主 症：四肢末端發涼、怕冷、痠痛、麻木、間歇性跛行，繼而夜間劇痛難忍，後期出現趾(指)節壞死脫落。

病假建議：1-3 天

股 腫

診 斷：股腫

主 症：發病肢體疼痛，走動可使疼痛加劇，常伴有發熱畏寒等全身症狀。過去多有長期臥床、久坐、產後傷氣、腹部手術、外傷、腫瘤或其他血管疾病的病史。

病假建議：1-3 天

蛇 咬

診 斷：蛇咬傷

主 症：被蛇咬傷後，局部出現牙痕傷口。無毒蛇咬傷者，若合併感染，傷處可有紅腫灼痛；神經毒的毒蛇咬傷後，局部不紅、不腫、無滲液，微痛及麻木，但很快出現神經系統損害的全身症狀；血液毒的毒蛇咬傷後，傷口劇痛，腫脹、有水疱，並出現血液系統受損的全身症狀；混合毒的毒蛇咬傷後，傷口周圍迅速紅腫、疼痛、麻木、有水疱，並有神經、血循系統的全身症狀。

病假建議：轉送醫院進一步救治。

燒傷、燙傷

診 斷：燒傷或燙傷

主 症：傷面紅腫熱痛，為一度燒傷；紅腫劇痛兼有水疱者，為二度燒傷；傷面有焦痂，傷及皮膚全層，甚至皮下組織、肌肉和骨骼者，為三度燒傷。

病假建議： 根據灼傷部位、灼傷面積、灼傷深度而決定。若灼傷部位影響視覺和負重活動者，或燒傷面積較大、較深者，酌情建議病假 1-3 天或轉送醫院進一步處理。